

ala 60

Αναισθησιολογικό Τμήμα

Όνοματεπώνυμο ασθενούς:

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ημερομηνία	Φάρμακο	Τρόπος χορήγησης	Δόση	Συχνότητα	Ώρα	Παρατηρήσεις	Υπογραφή
Βράδυ προ χειρουργείου	Ptinolin	Από στόμα	150 mg	Άπαξ	20 ⁰⁰		
Ημέρα χειρουργείου	Mefoxil	ενδοφλέβια	1 gr	Απαξ	1 ώρα προ χειρουργείου	Επί αλλεργίας ρωτήστε τον Μαιευτήρα	
Ημέρα του χειρουργείου	Ptinolin	ενδοφλέβια	50 mg	Άπαξ	1 ώρα προ χειρουργείου		
Ημέρα του χειρουργείου	Primperan	ενδοφλέβια	10 mg	Άπαξ	1 ώρα προ χειρουργείου		

- Τοποθέτηση 2 φλεβοκαθετήρων (πράσινοι)

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Επί ναυτίας/εμέτου /

Ημερομηνία	Φάρμακο	Τρόπος χορήγησης	Δόση	Συχνότητα	Ώρα	Παρατηρήσεις	Υπογραφή
	Apotel						
	Voltaren						
	Dynastat						
	Πεθιδίνη						
	Primperan					Επί ναυτίας/εμέτου	
	Ondasetron					Επί ναυτίας/εμέτου	

Ημερομηνία	Υγρά	Ροή	Παρατηρήσεις	Υπογραφή

- Η αντιπηκτική να γίνει 6 ώρες μετά το τέλος του χειρουργείου Υπογραφή:
- Μετά την απομάκρυνση από την ανάνηψη, παρακολούθηση ζωτικών σημείων (πίεση, σφύξεις, καρδιακή συχνότητα) ανά ώρα το πρώτο 8ωρο.
- Έλεγχος κινητικότητας κάτω άκρων μέχρι πλήρους κινητοποίησης της ασθενούς.
- Έναρξη κινητοποίησης

Έναρξη σίτισης:

(Επί αμφιβολίας μιλήστε με τον αναισθησιολόγο)